

**PLANTES NOUVELLES RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM.**

(NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. XXVIII)

Par A. GUILLAUMIN

202. — *Coelogyne nigro-furfuracea* Guillaum. — Annam : acheté au marché de Dalat (TIXIER, Calanthe, n^o 75, f. 279, 1958).

437. — *C. lactea* Reichb. f. — Annam : Dalat (TIXIER, Coelogyne n^o 6, f. 203, 1956).

Espèce de Birmanie pas encore signalée en Indochine. PFITZER (*Pflanzenreich* IV, 50, II, B, 7, p. 46) la considère seulement comme une variété de *C. Huettneriana* Reichb. f.

438. — ***Dendrobium pseudo-intricatum*** Guillaum. sp. nov.

Caulis cylindricus, basi gracilis (2 mm diam.), ad apicem sensim crassior (5 mm) ; foliis lanceolatis (6-7 cm × 1,5 cm), apice leviter inaequaliter acutissimis, tenuibus, nervis haud conspicuis. Racemi laterales in caulibus foliatis vel defoliatis, 2-flori, peduncolo 0,5 cm longo, bracteis scarioso-membranaceis, ovato-truncatis, pedicello ovarioque 1,5 cm longis, floribus albis leviter luteolis, labello pallidissime roseo, sepalis superiore ovato, acuto, 1 cm longo, 3-nervio, lateralibus ovatis, acutis, in mentum acutum longe (1,3 cm) decurrentibus, 3-nerviis, petalis similibus, 3-5 nerviis, labello 1,5 cm longo, minutissime denticulato et supra lanuginose nigro penicillato.

Annam : Blao (TIXIER n^o 10 bis/61 f. 55, 1961).

Aspect de *D. intricatum* Gagnep, mais à labelle présentant en dessus, vers l'extrémité, une touffe de poils ondulés et non un repli convexe sans poils.

Reçu seulement en échantillon sec mais pas en plante vivante.

439. — ***Taeniophyllum vietnamense*** Tixier et Guillaum. sp. nov.

Epiphytica, aphylla, acaulis, radicibus complanatis, viridibus, (5—10 mm × 3—4 mm) ; scapo racemoso, 2 cm longo, bracteis triangularibus, 1 mm longis, flore 5 mm longo, fere cleistogama, sepalis petalisque similibus, ovato-lanceolatis (2 mm × 0,90 mm), luteo viridibus, labello eburneo, 1,5 mm longo, circa 1 mm lato, apice carnose cucullato, calcare pendulo, scrotiformi, columna 0,8 mm longa, operculo galeato, purpureo 2-maculato, pollinibus 2.

Viet-nam : environs de Dink-Quan, forêt inondable, floraison début de mars. (TIXIER n^o 20/62, f. 139, 1962).

PLANTES AUTRES QUE DES ORCHIDÉES.

440. — *Nepenthes anamensis* Macfarl. — Annam : environs de Dalat, 1.400 m., sur un talus de route dans une pinède de *Pinus Khasyana* (PLESSIS f. 2, 1962).

Urne atteignant 4-5 cm de longueur, en dehors jaune paille puis jaune paille dans la moitié inférieure, rose foncé dans la moitié supérieure et sur l'opercule, enfin rose sur toute la surface.

Introduit du Lang bian par MICHOLITZ chez SANDER en 1905.

C'est la même espèce dont le Muséum avait déjà reçu des graines qui n'avaient pas germé. (C.R.S.T., de Silgaldi, f. 174 bis, 1955).

395. — *N. Thorelii* H. Lec. — Annam : Dalat (TIXIER, f. 244, 1957). Urne rose carmin en dehors, blanc jaunâtre piqueté de rouge à l'intérieur.

441. — *Toxocarpus villosus* Dcne. — Annam : Suoi Dau (DE SIGALDI, n° 352/Sig.). Petite liane à fleur jaune d'or, tige et dessous des feuilles duveteux, couleur brune, du latex.

Le Gérant : Jacques FOREST.